

Strefa przygotowania



1
Dezynfekcja rąk
z alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



2
Dezynfekcja tacy
uniwersalną chusteczką
dezynfekującą i odczekanie
do wyschnięcia



3
Skompletowanie sprzętu
(pakiet do kaniulacji może
standaryzować sprzęt
i zaoszczędzić czas)



4
Dezynfekcja rąk
z alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



5
Przygotowanie sprzętu
ochrona Krytycznych Punktów
za pomocą techniki bezdotykowej
(NTT) i Mikro Aseptyka Pola
(korki i opakowania)



6
Dezynfekcja rąk
po zakończonym
przygotowaniu oraz ponownie
po kontakcie z pacjentem
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

Strefa pacjenta



7
Ułożenie ręki
na serwetce i poduszkę
(użycie jednorazowej
stazy)



8
Założenie jednorazowej stazy
stazy, wybranie żyły,
poluzowanie stazy



9
Dezynfekcja rąk
z alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



10
Zaciśnięcie stazy
(użycie jednorazowej
stazy)



11
Założenie rękawiczek
(należy użyć sterylnych, jeśli
Kluczowe Punkty muszą być
dotykane bezpośrednio)



12
Dezynfekcja skóry
za pomocą aplikatora z 2%
chlorheksydydą / 70%
alkoholem przez 30 sekund



13
Wprowadzenie kaniuli
za pomocą NTT i podłączenie
drenu przedłużającego -
przepłukanie linii infuzyjnej



14
Zabezpieczenie kaniuli
półprzepuszczalnym,
przezroczystym opatrunkiem
przy użyciu NTT



15
Usuwanie ostrych narzędzi i sprzętu




16
Utylizacja rękawiczek
potem fartuch i natychmiast...



17
Dezynfekcja rąk
z alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

Strefa dekontaminacji



18
Dezynfekcja tacy
uniwersalną chusteczką
dezynfekującą i odczekanie
do wyschnięcia



19
Dezynfekcja rąk
z alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

