


Czysta strefa przygotowania



Założenie maski i czepka



Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



Zdezynfekuj stółik
zgodnie z lokalnym
protokołem



Przygotowanie sterylnego pola
używając NTT do ochrony
punktów kluczowych

Strefa pacjenta



Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



Założenie fartucha
(sterylnie) bez
zanieczyszczania
zewnątrznej strony



Założenie sterylnych rękawic przy użyciu
odpowiedniej techniki i innych
wymaganych środków ochrony
indywidualnej



Przygotowanie sterylnego pola
używając NTT do ochrony
Kluczowych Punktów



Przygotowanie znieczulenia miejscowego
& 0.9% NaCl stosując NTT



Zastosowanie jałowej serwety
pod dolną część
ramienia pacjenta



Dezynfekcja skóry
aplikatorem zawierającym 2%
CHG/70% alkoholu przez 30
sekund. Pozostawić do
wyschnięcia



Przykrycie pacjenta serwetą „od stóp do
głowy”



Zabezpieczenie sterylną osłoną
głowicy USG



Nakłucie żyły & wprowadzenie micro-introductory & wybór długości PICC



Wprowadzenie PICC przy użyciu
kleszczyków (NTT)



Zabezpieczenie opatrunkiem
zgodnie z lokalnym
protokołem



Utylizacja odpadów
rękawic & innych PPE &
natychmiast ...




Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

Strefa dekontaminacji



Dezynfekcja stolika
zgodnie z lokalnym
protokołem



Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

