



Wchodząc do domu pacjenta zdezynfekować ręce



**1**  
**Zastosowanie jednorazowego fartucha**



**2**  
**Skompletowanie sprzętu & przygotowanie miejsca**



**3**  
**Dezynfekcja rąk** alkoholem do rąk lub wodą z mydłem



**4**  
**Otworzenie zestawu** Należy traktować jak **Ogólne Pole Aseptyczne** przy użyciu techniki bezdotykowej (NTT)



**5**  
**Stosowanie rękawic diagnostycznych** zgodnie z lokalnym protokołem



**6**  
**Przygotowanie leków** chroniąc **Krytyczne Punkty** stosując NTT & Mikro Pole Aseptyczne



**7**  
**Utylizacja ostrych narzędzi i sprzętu**



**8**  
**Utylizacja rękawic**



**9**  
**Dezynfekcja rąk** alkoholem do rąk lub wodą z mydłem



**10**  
**Stosowanie rękawic diagnostycznych** zgodnie z lokalnym protokołem

*Pomiędzy krokami 8, 9, 10, jeśli możesz przejść bezpośrednio do kroku 11 bez skażenia rękawiczek*



**11**  
**„Przecieraj” port**

- Używając NTT, z 2% chlorheksydyną / chusteczką z 70% alkoholem
- Przecierając cały łącznik bezigłowy przez minimum 15 sekund przy użyciu różnych obszarów chusteczki
- Następnie przecierając końcówki i membranę łącznika bezigłowego
- Pozostawiając do wyschnięcia przed użyciem



**12**  
**Podanie leków z użyciem NTT**



**13**  
**Utylizacja rękawic fartucha i natychmiast...**



**14**  
**Dezynfekcja rąk** alkoholem do rąk lub wodą z mydłem



**15**  
**Utylizacja odpadów** zgodnie z lokalnym protokołem



Opuszczając dom pacjenta zdezynfekować ręce

