

* Różne kombinacje opatrunków i mocowań PICC wymagają innego postępowania. Użyj ANTT[®] Risk Assessment, aby wybrać Standardową lub Chirurgiczną ANTT

Strefa przygotowania



1
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



2
Dezynfekcja powierzchni zgodnie z lokalnym protokołem



3
Skompletowanie sprzętu & materiałów


Strefa pacjenta



4
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



5
Zastosowanie jednorazowego fartucha



6
Założenie rękawic diagnostycznych



7
Usunięcie opatrunku stosując technikę bezdotykową (NTT)



8
Utylizacja rękawic następnie fartucha oraz sprzętu i natychmiast...



9
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



10
Przygotowanie sterylnego pola używając NTT do ochrony Kluczowych Punktów



11
Założenie sterylnych rękawic przy użyciu odpowiedniej techniki i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej



12
Dezynfekcja skóry aplikatorem zawierającym 2% CHG/70% alkoholu przez 30 sekund. Pozostawić do wyschnięcia



13
Założenie opatrunku razem z mocowaniem stosując NTT



14
Utylizacja rękawic fartucha i natychmiast...



15
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

Strefa dekontaminacji



16
Dezynfekcja stolika zgodnie z lokalnym protokołem



17
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem

