



Po wejściu do domu pacjenta należy zdezynfekować ręce



**1 Dezynfekcja tacy**  
zgodnie z lokalnymi zasadami tworzenia **Ogólnego Pola Aseptycznego**. Pozostawić do wyschnięcia



**2 Stosowanie fartucha jednorazowego**



**3 Skompletowanie sprzętu**  
i umieszczenie na tacy



**4 Dezynfekcja rąk**  
ścierką z alkoholem do rąk lub mydło i woda



**5 Stosowanie rękawic**  
zgodnie z lokalnym protokołem



**6 Przygotowanie leków**  
Ochrona **kluczowych punktów** za pomocą techniki bezdotykowej (NTT) i **Mikro Pola Aseptycznego**



**7 Utylizacja ostrych narzędzi i sprzętu**



**8 Utylizacja rękawic**  
i natychmiast ...



**9 Dezynfekcja rąk**  
ścierką z alkoholem do rąk lub mydłem i wodą



**10 Założenie nowych rękawic**  
zgodnie z lokalnym protokołem

**Pomiń kroki 8,9,10, jeśli możesz kontynuować bezpośrednio do kroku 11 bez skażenia rękawic**



**11 „Przecieraj” port**

- Używając NTT, z 2% chlorheksydyną / chusteczką z 70% alkoholem

- Przecierać cały łącznik bezigłowy przed minimum 15 sekund przy użyciu różnych obszarów chusteczki

- Następnie przetarcie końcówki łącznika bezigłowego

- Pozostawić do wyschnięcia przed użyciem



**12 Podawanie leków**  
przy użyciu NTT



**13 Dezynfekowanie tacy**  
zgodnie z lokalnym protokołem



**14 Utylizacja rękawic**  
fartucha oraz sprzętu i natychmiast...



**15 Dezynfekcja rąk**  
ścierką z alkoholem do rąk lub mydłem i wodą



**16 Utylizacja odpadów**  
zgodnie z lokalną polityką



Dezynfekcja rąk przy opuszczaniu domu pacjenta

