

* Różne kombinacje opatrunków i mocowań PICC wymagają innego postępowania. Użyj ANTT[®] Risk Assessment, aby wybrać Standardową lub Chirurgiczną ANTT

Strefa przygotowania



1
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



2
Skompletowanie sprzętu & materiałów


Strefa pacjenta



3
Dezynfekcja rąk
alkoholem do rąk
lub wodą z mydłem



4
Zastosowanie jednorazowego fartucha




5
Dezynfekcja powierzchni zgodnie z lokalnym protokołem



6
Dezynfekcja tacy zgodnie z lokalnymi zasadami tworzenia **Ogólnego Pola Aseptycznego**. Pozostawić do wyschnięcia



7
Ułożenie sprzętu



8
Założenie rękawic diagnostycznych



9
Usunięcie opatrunku stosując technikę bezdotykową (NTT)



10
Utylizacja rękawic fartucha oraz sprzętu i natychmiast...



11
Dezynfekcja rąk alkoholem do rąk lub wodą z mydłem



12
Przygotowanie sprzętu Ochrona Kluczowych Punktów za pomocą techniki bezdotykowej (NTT) i Mikro Pola Aseptycznego



13
Założenie rękawic diagnostycznych



14
Dezynfekcja skóry z 2% CHG / 70% IPA stosując przecieranie przez 30 sekund. Pozostawić do wyschnięcia



15
Założenie opatrunku razem z mocowaniem stosując NTT



16
Utylizacja rękawic fartucha i natychmiast...



17
Dezynfekcja rąk alkoholem do rąk lub wodą z mydłem

Strefa dekontaminacji



18
Dezynfekcja tacy zgodnie z lokalnymi protokołami



19
Dezynfekcja rąk alkoholem do rąk lub wodą z mydłem

