

Strefa przygotowania



Dezynfekcja rąk
ścieraczką z alkoholem
do rąk lub mydłem i
wodą



Dezynfekcja tacy
zgodnie z lokalnymi
zasadami tworzenia
**Ogólnego Pola
Aseptycznego**.
Pozostawić do wyschnięcia



**Skompletowanie
sprzętu**
& umieszczenie na tacy




Dezynfekcja rąk
ścieraczką z alkoholem
do rąk lub mydłem i
wodą



Przygotowanie sprzętu
Ochrona kluczowych punktów za
pomocą techniki bezdotykowej
(NTT) i Mikro Pola Aseptycznego

Strefa wokół pacjenta



**Stosowanie
jednorazowego
fartuch**



Dezynfekcja rąk
ścieraczką z alkoholem
do rąk lub mydłem i
wodą



**Przetarcie korków
butelek** przez 15 sekund
przy użyciu chusteczki z 2%
CHG/70% alkoholem
używając NTT



Ułożenie ręki
na poduszce i
serwecie



**Założenie
jednorazowej stazy,**
wybranie żyły, poluzowanie
stazy



Dezynfekcja rąk
ścieraczką z alkoholem
do rąk lub mydłem i
wodą



**Ponowne zaciśnięcie
stazy**



**Założenie rękawic
diagnostycznych**
zgodnie z lokalnym
protokołem



Dezynfekcja skóry
aplikatorem zawierającym 2%
CHG/70% alkoholu przez 30
sekund. Pozostawić do
wyschnięcia



Nakłucie żyły
(W przypadku ponownego
nakłucia należy ponownie
oczyszczyć skórę przed
nakłuciem)



Przelać krew
do butelek za pomocą NTT
i zwolnić stazę



**Nałożenie sterylnej
opatrunku**
przy użyciu NTT




**Utylizacja ostrych
narzędzi**
i sprzętu. Oznaczenie butelek



Utylizacja rękawic
następnie fartucha i natychmiast
przeprowadzić dezynfekcję rąk

Strefa dekontaminacji



Dezynfekcja tacy
zgodnie z lokalnymi
protokołami



Dezynfekcja rąk
ścieraczką z alkoholem
do rąk lub mydłem i
wodą

